

Commune: SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Lieu: Les Hébihens
Coquillage: Coques (*Cerastoderma edule*)

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

SITE TOLERE

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

RISQUE SANITAIRE FAIBLE

Localisation / Environnement

Ce gisement de coques est situé au sud des Hébihens à l'extrémité Nord de la presqu'île de St-Jacut-de-la-Mer. Il fait l'objet d'une pêche récréative importante. Éloigné de sources de contaminations ponctuelles, sa qualité sanitaire peut varier en fonction de la courantologie et des apports terrigènes plus ou moins éloignés (Baie de Lancieux, Baie de L'Arguenon)

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques




Tableau de répartition

Paramètre	<i>Escherichia coli</i> / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	25	10	1	0	0
Fréquences	69,4%	27,8%	2,8%	0,0%	0,0%

Ce gisement est de qualité moyenne

Dernier résultat

DATE	Nb E coli /100g CLI	Normes *
14/05/2014	45	≤ 230 E.coli/100gCLI

Le dernier résultat est conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

Conclusion

Le gisement présente une qualité moyenne, avec un pic présentant une qualité médiocre. La pêche à pied y est tolérée.

La consommation de coquillage ne peut être considérée comme en permanence sans risque pour la santé. La cuisson est un moyen de réduire significativement le risque sanitaire.